

透析用藥安全注意事項

一、使用心血管用藥、降血壓藥物：

定時定量服用，勿自行停藥，每日定時監測血壓，如血壓過高或過低，應檢查下肢水腫情形，若有異常可詢問腹膜透析室處理方式，或到醫院就診。

二、磷結合劑：

應於飯中與含蛋白質食物一起服用，建議磨粉或咬碎與食物均勻混合，醋酸鈣因味道偏酸，建議飯中或飯後配水吞服即可。

三、紅血球生成素(EPO)：

應依照醫師處方定期注射，以皮下注射效果為佳，領回家後需冷藏保存，注射前藥劑回復常溫再注射。

四、鐵質補充劑：

口服以空腹為佳，若空腹時服用有腸胃道副作用，則改為飯後或睡前狀況，若有出現不適反應時需及時反應醫護人員。

五、若有便秘情形時：

軟便劑或輕瀉劑，應定期服用，以維持腸道通暢，但出現嚴重腹瀉等情況，則與醫師討論藥物劑量的調整。

六、服用降血脂類用藥：

若出現肌肉酸痛、行走無力等症狀，則應立即反應並與醫師討論是否停藥，或到醫院做進一步抽血檢查。

七、 肌肉鬆弛類及鎮靜安眠類藥物：

有嗜睡之作用及副作用，應注意服藥後勿從事開車等危險行為，失眠患者應增加白天的活動量，例如做簡易體操、簡單農作、散步，以減少白天睡眠時間。

聯絡資訊	
義大醫院 地址：高雄市燕巢區角宿里義大路1號 電話：07-6150952	義大大昌醫院 地址：高雄市三民區大昌一路305號 電話：07-6150208